

از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸
تا ۱۹ فروردین ماه ۹۹

۲۵۷ نفر



۵۲ ۲۰۵



بیشترین تعداد ارجاعات

تهران ۱۹۲ نفر



استان‌های بدون مسمومیت الکلی

خراسان شمالی | خراسان جنوبی
لرستان | کرمان
کهگیلویه و بویر احمد

توصیه‌ها

۱ مصرف الکلی اتیلیک (اتانول) به عنوان دهان‌شویه یا غرغره کردن آن در محوطه دهانی و یا نوشیدن آن هیچگونه اثری در پیشگیری از عفونت کووید-۱۹ ندارد و در صورت استفاده نامناسب با خطر بروز مسمومیت ناشی از اتانول همراه است.

۴

محلول و ژل الکلی برای ضدعفونی کردن دست‌ها و سطوح از مراکز معتبر و مورد تایید تهیه شود.

۳ متانول خاصیت ضدعفونی‌کنندگی پایینی دارد و با توجه به خواص سمی آن، اکیداً توصیه می‌شود تا از متانول یا الکلی صنعتی برای ضدعفونی کردن دست‌ها و یا سطوح و وسایل و یا از خوردن آن برای ضدعفونی و از بین بردن ویروس کرونا استفاده نشود.


۵ هموطنانی که در قرنطینه به سر می‌برند، جهت شستشوی دست‌های خود بهتر است از آب و صابون استفاده و با روش صحیح دست‌ها را شستشو کنند، نیازی به استفاده از محلول ضدعفونی‌کننده نخواهند داشت؛ مگر در مواردی جهت ضدعفونی لوازم خریداری شده یا پس از تماس با وسایل یا سطوح آلوده، توجه شود که در این موارد پس از شستشوی صحیح دست‌ها با آب و صابون نیازی به استفاده از محلول‌های الکلی نخواهد بود.

۷۲۸ نفر در ۲ ماه گذشته

بر اثر مسمومیت الکلی جان باختند

قربانیان مسمومیت با الکلی

یک‌پنجم قربانیان کرونا




مرگ در اثر
مسمومیت
ناشی از مصرف
الکلی

از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۷
تا ۱۹ فروردین ماه ۹۸

۶۶ نفر

از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸
تا ۱۹ فروردین ماه ۹۹

۴۷۱ نفر



۴۹ ۴۲۲

سن درگذشتگان

۱۴ تا ۷۸